

# Matematik

Bedömningsanvisningar  
för samtliga skriftliga provdelar

1b

## Innehåll

Bedömning .....	3
Bedömningsanvisningar Del B .....	4
Bedömningsanvisningar Del C .....	6
Bedömningsanvisningar Del D .....	7
Bedömda elevarbeten Del B .....	10
Bedömda elevarbeten till uppgift 9 .....	10
Bedömda elevarbeten till uppgift 12 .....	11
Bedömda elevarbeten Del C .....	13
Bedömda elevarbeten till uppgift 13 .....	13
Bedömda elevarbeten Del D .....	24
Bedömda elevarbeten till uppgift 19 .....	24
Bedömda elevarbeten till uppgift 21b .....	25
Kravgränser .....	28
Insamling av provresultat för matematik kurs 1b .....	29
Provsammanställning – Centralt innehåll kurs 1b .....	30
Provprofil kurs 1b .....	31

## **Bedömnning**

Det här häftet innehåller bedömningsanvisningar för samtliga skriftliga provdelar.

Utgångspunkten är att eleverna ska få poäng för lösningens förtjänster och inte poängavdrag för fel och brister. Det går då att ge delpoäng för en lösning som visar att en elev kommit en bit på väg. Elevernas lösningar ska bedömas med högst det antal poäng som anges i bedömningsanvisningarna.

Bedömningen ska göras med olika kvalitativa förmågepoäng, E-, C- och A-poäng som märkts med den förmåga som främst kan visas. Uppgiftens innehåll och elevarbetenas kvalitet har bedömts utifrån ämnesplanen och kunskapskraven. De olika uppgifterna har kategoriseras och olika lösningar till dessa har analyserats. Sedan har svaret, lösningen eller dellösningen poängsatts med kvalitativa förmågepoäng.

I provhäftena visas endast nivån på poängen. Till exempel innehåller (1/2/3) att uppgiften kan ge högst 1 E-poäng, 2 C-poäng och 3 A-poäng.

I bedömningsanvisningarna anges vad som krävs för varje poäng. Poängen anges med både nivån och med den förmåga som främst kan visas. Till exempel innehåller +E<sub>P</sub> en poäng som svarar mot kunskapskravet för betyget E för procedurförståelsen och +A<sub>R</sub> en poäng som svarar mot kunskapskravet för betyget A för resonemangsförståelsen. I några av uppgifterna har vi ansett det lämpligt att ange bedömningsanvisningarna i matrisform då progressionen i förståelsen då framgår tydligare.

För uppgifter av kortsvartyp, där endast svar krävs, finns exempel på godtagbara svar i bedömningsanvisningarna. Endast svaret beaktas.


För uppgifter där redovisning fordras finns exempel på godtagbara svar och bedömningsanvisningar för delpoäng. För full poäng krävs redovisning med godtagbart svar eller slutsats. Godtagbar metod eller förklaring till hur uppgiften kan lösas ska ge delpoäng även om det därefter följer en felaktighet, t.ex. räknefel. Om eleven också slutför uppgiften korrekt ger det fler poäng.


I slutet av dessa bedömningsanvisningar, sid. 30, finns en provsammanställning som visar vilket centralt innehåll som respektive uppgift prövar. På sid. 31 finns även en provprofil där samtliga kvalitativa förmågepoäng finns markerade. Denna profil ger en bild över elevens förmågespridning på provet och kan därför ge stöd vid betygssättningen. Den kan även användas för att ge återkoppling av provresultatet till eleven.

Dokument med provkonstruktörernas uppdelning och numrering av kunskapskrav och centralt innehåll finns på [www.prim-gruppen.se](http://www.prim-gruppen.se).

Mer information om bedömningen av förmågor finns i det gröna häftet med lärarinformation.

## Bedömningsanvisningar Del B

Uppgift	Exempel på godtagbara svar	Poäng																						
1.	Minskning med 60 % ; – 60 % Anger enbart korrekt procentuellt värde (60 %). Godtagbart svar t.ex. minskning med 60 %.	(2/0/0) +E <sub>B</sub> +E <sub>B</sub>	<table border="1"><tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td></tr></table>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
2.	$x = 1/9$ Godtagbart svar.	(1/0/0) +E <sub>P</sub>	<table border="1"><tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td></tr></table>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
3.	$x = 2$ Korrekt svar.	(2/0/0) +E <sub>B</sub> +E <sub>P</sub>	<table border="1"><tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td></tr></table>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
4.	 Minst en korrekt utritad symmetrilinje. Samtliga symmetrilinjer korrekt utritade.	(1/1/0) +E <sub>B</sub> +C <sub>P</sub>	<table border="1"><tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td></tr></table>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
5.	$0,000\,393$ ; $3,93 \cdot 10^{-4}$ Godtagbart svar.	(1/0/0) +E <sub>B</sub>	<table border="1"><tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td></tr></table>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
6.	18 Korrekt svar.	(0/1/0) +C <sub>P</sub>	<table border="1"><tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td></tr></table>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
7. a)	4 Korrekt svar.	(0/1/0) +C <sub>B</sub>	<table border="1"><tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td></tr></table>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
b)	$x = 6$ Korrekt svar.	(0/1/0) +C <sub>B</sub>	<table border="1"><tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td></tr></table>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
8. a)	Punkten (2, 4) markerad Korrekt markerad punkt.	(1/0/0) +E <sub>P</sub>	<table border="1"><tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td></tr></table>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
b)	Punkten (4, -2) markerad Korrekt markerad punkt.	(0/2/0) +C <sub>B</sub> +C <sub>P</sub>	<table border="1"><tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td></tr></table>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								

9.	<p><b>75 % ; 3/4 ; 0,75</b>            Påbörjad lösning, t.ex. visar två olika utfallsrum beroende på första karamellens färg.            Lösning med korrekt svar.  <i>Bedömda elevarbeten se sid. 10.</i></p>	(0/2/0) $+C_B$ $+C_{PL}$	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	B			P			Pl			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
Pl																								
M																								
R																								
K																								
10.	<p><b>59</b>            Påbörjad lösning, t.ex. visar att ettorna står för <math>49 (7^2)</math> och 7.            Lösning med korrekt svar.</p>	(0/2/0) $+C_B$ $+C_P$	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	B			P			Pl			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
Pl																								
M																								
R																								
K																								
11.	<p><b><math>n=2</math></b>            Korrekt svar.</p>	(0/0/2) $+A_B+A_P$	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	B			P			Pl			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
Pl																								
M																								
R																								
K																								
12.	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anger och motiverar minst en punkt där båda villkoren är uppfyllda.</li> <li>• Markerar olikheten <math>x \geq 2</math> korrekt.</li> <li>• Markerar olikheten <math>x + y \leq 0</math> korrekt.</li> </ul> <p>En av ovanstående punkter är uppfyllt.            Två av ovanstående punkter är uppfyllda.            Korrekt markerat område            med tydlig redovisning och motivering.  <i>Bedömda elevarbeten se sid. 11–12.</i></p>	(0/2/2) $+C_B$ $+C_B$ $+A_{PL}$ $+A_K$	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	B			P			Pl			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
Pl																								
M																								
R																								
K																								

## Bedömningsanvisningar Del C

Uppgift 13, bedömningsmatris, (3/4/5)

FÖRMÅGOR	E	C	A
<b>Begrepp</b>			
<b>Procedurer</b>	Eleven bestämmer radien/diametern på cirkeln i figur 1. +E <sub>P</sub>	Eleven bestämmer diagonalen/största radien, t.ex. genom mätning i skalenlig figur. +C <sub>P</sub>	Eleven bestämmer diagonalen/största radien på ett effektivt sätt, t.ex. genom att använda Pythagoras sats. +A <sub>P</sub>
<b>Problemlösning</b>	Eleven bestämmer längden av någon myrpromenad korrekt. +E <sub>PL</sub>  Eleven visar, t.ex. genom beräkningar, att myrans väg i figur 1 och figur 2 är lika lång. +E <sub>PL</sub>	Eleven visar att det finns en begränsning för största radien, t.ex. genom beräkningar, beskrivningar eller bilder. +C <sub>PL</sub>	Eleven använder en generell metod för att visa att promenadvägen alltid är lika lång <i>eller</i> bestämma den största radien. +A <sub>PL</sub>
<b>Matematiska modeller</b>			
<b>Matematiska resonemang</b>		Eleven ger en rimlig <i>kommentar</i> till varför promenaden alltid är lika lång <i>eller</i> visar att promenaden är lika lång även för ett eget valt värde <i>eller</i> påbörjar en algebraisk lösning. +C <sub>R</sub>	Eleven för ett utförligt resonemang kring att promenaden alltid är lika lång genom att: hänvisa till att det råder proportionalitet mellan diameter och omkrets <i>eller</i> göra detta troligt med flera egna valda värden <i>eller</i> visa detta algebraiskt. +A <sub>R</sub>
<b>Kommunikation</b>		Elevenens redovisning är klar och tydlig och omfattar minst tre deluppgifter. Det matematiska språket är lämpligt. +C <sub>K</sub>	Eleven gör en välstrukturerad lösning samt använder matematiska symboler med god anpassning till syfte och situation. +A <sub>K</sub>

## Bedömningsanvisningar Del D

Uppgift	Godtagbara svar	Poäng	
14. a)	Påbörjad lösning, t.ex. beräknar kostnaden för antalet samtal. Redovisar fullständig lösning.	(2/0/0) +E <sub>P</sub> +E <sub>M</sub>	E C A B P P M PI R M R R K K
b)	"Det beror på att de ringt olika många samtal." ; "Den ena har ringt fler gånger medan den andra har pratat längre." Godtagbart resonemang.	(2/0/0) +E <sub>PL</sub> +E <sub>R</sub>	E C A B P P M PI R M R R K K
15.	12 m Använder formeln och beräknar någon bromssträcka oberoende av hastighet. Bestämmer bromssträckan för hastigheten 50 km/h eller 70 km/h. Redovisning med korrekt svar.	(2/1/0) +E <sub>P</sub> +E <sub>M</sub> +C <sub>PL</sub>	E C A B P P M PI R M R R K K
16. a)	156 miljarder (svar i intervallet (148–160) miljarder) Godtagbar avläsning (intervallet (180–195) miljarder). Redovisning med godtagbart svar.	(2/0/0) +E <sub>P</sub> +E <sub>P</sub>	E C A B P P M PI R M R R K K
b)	"Avståndet mellan årtalen på x-axeln är inte lika stora." Knapphändig beskrivning som inte anger på vilket sätt diagrammet är missvisande, t.ex. "År 2003 är inte med". Beskrivning som anger att skalan inte är ekvidistant.	(1/1/0) +E <sub>R</sub> +C <sub>R</sub>	E C A B P P M PI R M R R K K
c)	"Kurvan skulle inte blivit lika brant, då man skulle förlängt x-axeln i förhållande till y-axeln. Mellan 2007 och 2010 hade kurvan blivit mindre brant, då 2 årtals statistik saknas." Beskrivning som antyder ett korrekt diagrams utseende. Beskrivning som tydligt anger hur ett korrekt diagram kommer att påverkas. <u>Bedömda avskrivna autentiska elevarbeten</u> 1/0/0 "Det skulle vara en mycket långsammare ökning." 1/1/0 "Skulle man rita om diagrammet skulle främst x -axeln bli längre då det saknas 3 år. Diagrammet skulle inte ge samma effekt – utökningen av skickade mejl ser ut att ha gått väldigt långsamt." 1/1/0 "Kurvan skulle inte blivit lika brant, då man skulle förlängt x-axeln i förhållande till y-axeln. Mellan 2007 och 2010 hade kurvan blivit mindre brant, då 2 årtals statistik saknas."	(1/1/0) +E <sub>M</sub> +C <sub>M</sub>	E C A B P P M PI R M R R K K
17.	570 % ; 567 % Påbörjad lösning där det framgår att ökningen jämförs med 0,1. Redovisad lösning med godtagbart svar.	(1/2/0) +E <sub>B</sub> +C <sub>K</sub> +C <sub>B</sub>	E C A B P P M PI R M R R K K

18. a)	<p><b>490 kr</b></p> <p>Påbörjad lösning, t.ex. beräknar kostnaden för tryck eller ram. Redovisad lösning med korrekt svar.</p>	(1/2/0)	<table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>+E<sub>P</sub> +C<sub>K</sub> +C<sub>M</sub></p>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
b)	<p><b>Kostnad: <math>a \cdot b \cdot 0,12 + (2a + 2b) \cdot 0,45 + 169</math></b> där <math>a</math> = längd i cm och <math>b</math> = bredd i cm Påbörjad lösning, t.ex. ställer upp ett algebraiskt uttryck för kostnaden för tryck eller ram, med längd och bredd som variabler. Godtagbar fullständig formel med definierade variabler.</p>	(0/2/2)	<table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>+C<sub>M</sub>+C<sub>K</sub> +A<sub>M</sub> +A<sub>K</sub></p>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
19.	<p><b>6 kombinationer</b> Påbörjad lösning, t.ex. visar en kombination eller faktorisering. Visar minst tre korrekta kombinationer. Korrekt svar med redovisning som visar att alla möjliga kombinationer är funna, t.ex. genom att visa alla faktorer. <i>Bedömda elevarbeten se sid. 24.</i></p>	(1/1/1)	<table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>+E<sub>B</sub> +C<sub>B</sub> +A<sub>B</sub></p>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
20. a)	<p><b>Annuitetslån:</b> svar i intervallet (2 600–2 800) kr, <b>lån med rak amortering:</b> svar i intervallet (3 400–3 600) kr och (1 700–1 900) kr Minst två korrekta avläsningar. Godtagbar avläsning i samtliga fall.</p>	(1/1/0)	<table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>+E<sub>P</sub> +C<sub>B</sub></p>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
b)	<p>Visar att det stämmer för något av diagrammen, t.ex. <math>48 \cdot 1 750 \text{ kr} = 84 000 \text{ kr}</math> för lån med rak amortering.</p>	(0/2/0)	<table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>+C<sub>M</sub>+C<sub>R</sub></p>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
c)	<p><b>Räntekostnaden för annuitetslånet ca 45 000 kr och för lån med rak amortering ca 42 000 kr</b> Godtagbar bestämning av räntan för ett lån. Godtagbar bestämning av räntan för båda lånen med tydlig redovisning.</p>	(0/2/3)	<table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>+C<sub>P</sub>+C<sub>M</sub> +A<sub>B</sub>+A<sub>PL</sub> +A<sub>K</sub></p>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								
d)	<p><b>"Eftersom jag amorterar mindre i början så minskar lånets långsammare och därför blir den totala räntekostnaden högre."</b> Godtagbar förklaring som bygger på räntekostnad och lånebelopp. <u>Bedömda avskrivna autentiska elevarbeten</u> 0/2/0 "För att man betalar av så mycket i början av lånets så att räntan blev mindre senare." 0/2/0 "Vid ett lån med fast amortering är de första amorteringarna större, vilket gör att det totala lånebeloppet minskar snabbare än vid ett annuitetslån."</p>	(0/2/0)	<table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>+C<sub>B</sub>+C<sub>M</sub></p>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
E	C	A																						
B																								
P																								
PI																								
M																								
R																								
K																								

21. a)	<p><b>21,90 kr, 22,85 kr, (23,90 kr) och 25,90 kr</b>  Samtliga beräknade värden redovisade med godtagbart svar.</p>	(1/0/0) +E <sub>P</sub>	<table border="1" data-bbox="1241 197 1345 332"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K																														
E	C	A																																																		
B																																																				
P																																																				
PI																																																				
M																																																				
R																																																				
K																																																				
b)	<p><b>"Mikael har sett hur mycket priset minskat per 100 g efterhand som storleken stiger och inte använt medelvärdet som Josefins."</b></p> <table border="1" data-bbox="377 496 1075 893"> <thead> <tr><th></th><th>E</th><th>C</th><th>A</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>Josefins modell tolkas som ett medelvärde.</td><td>Beskrivning som visar förståelse för Mikael's modell.</td><td>Påpekar svagheten i Josefins modell och/eller styrkan i Mikael's modell.</td></tr> <tr><td>R</td><td>Eleven värderar med enkla omdömen genom att ge någon rimlig kommentar eller endast en beskrivning av beräkningar.</td><td>Eleven värderar med nyanserade omdömen genom att ge en enkel förklaring till modellerna.</td><td>Eleven värderar med nyanserade omdömen genom att analysera bådas resonemang.</td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><i>Bedömda elevarbeten se sid. 25–26.</i></p>		E	C	A	B				P				PL				M	Josefins modell tolkas som ett medelvärde.	Beskrivning som visar förståelse för Mikael's modell.	Påpekar svagheten i Josefins modell och/eller styrkan i Mikael's modell.	R	Eleven värderar med enkla omdömen genom att ge någon rimlig kommentar eller endast en beskrivning av beräkningar.	Eleven värderar med nyanserade omdömen genom att ge en enkel förklaring till modellerna.	Eleven värderar med nyanserade omdömen genom att analysera bådas resonemang.	K				(2/2/2)	<table border="1" data-bbox="1241 345 1345 480"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PI</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	B			P			PI			M			R			K		
	E	C	A																																																	
B																																																				
P																																																				
PL																																																				
M	Josefins modell tolkas som ett medelvärde.	Beskrivning som visar förståelse för Mikael's modell.	Påpekar svagheten i Josefins modell och/eller styrkan i Mikael's modell.																																																	
R	Eleven värderar med enkla omdömen genom att ge någon rimlig kommentar eller endast en beskrivning av beräkningar.	Eleven värderar med nyanserade omdömen genom att ge en enkel förklaring till modellerna.	Eleven värderar med nyanserade omdömen genom att analysera bådas resonemang.																																																	
K																																																				
E	C	A																																																		
B																																																				
P																																																				
PI																																																				
M																																																				
R																																																				
K																																																				

## Bedömda elevarbeten Del B

### Bedömda elevarbeten till uppgift 9

Elevarbete 1

Sannolikheten är antingen  $\frac{1}{2}$  eller  $\frac{2}{2}$   
beroende på om karamellen som låg i  
var röd eller grön.

om den som låg i var röd =  $\frac{1}{2}$

om den som låg i var grön =  $\frac{2}{2}$

0/1/0

E	C	A
B	X	
P		
PI		
M		
R		
K		

Elevarbete 2

Karamell 1 50 % grön

Karamell 2 100 % grön

0/2/0

E	C	A
B	X	
P		
PI	X	
M		
R		
K		

$$\frac{50\% + 100\%}{2} = \frac{150\%}{2} = 75\%$$

Elevarbete 3



0/2/0

E	C	A
B	X	
P		
PI	X	
M		
R		
K		

$$p(\text{grön}) = 100\%$$

$$p(\text{grön}) = 50\%$$


$$p(\text{röd}) = \frac{1}{4}$$

$$p(\text{grön}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 75\%$$

Svar: 75% chans att få en grön.

*Bedömda elevarbeten till uppgift 12*

**Elevarbete 1**



Där stämmer krysset för  
båda villkoren.  $(2;2)$

$$2 + -2 = 0$$


$$X = 2$$

**0/1/0**

E	C	A
B	X	
P		
Pl		
M		
R		
K		

**Kommentar:** En punkt korrekt markerad och motiverad.

**Elevarbete 2**




Eftersom  $x$  är större än två  
får värdet inte vara  
lägre än 2 på  $x$ -axeln.  
Samtidigt ska  $x+y$  ha  
ett värde lägre än noll.  
Koordinaterna kan därför  
endast placeras in i fält  
**IV** med ett  $x$ -värde över  
två.

**0/2/0**

E	C	A
B	X	
P		
Pl		
M		
R		
K		

**Kommentar:** Markerar olikheten  $x \geq 2$  och flera punkter korrekt markerade  
med motivering.

**Elevarbete 3**




**0/2/1**

E	C	A
B	X	
P		
Pl		X
M		
R		
K		

## Elevarbete 4

0/2/2

E	C	A
B	X	
P		
Pl		X
M		
R		
K	X	



X mäste vara lika med eller större än 2, alltså begränsas området av linjen vid A.  
 För att  $x+y$  ska vara 0 eller mindre måste y alltid vara  $-x$  eller mindre. Linje B visar var  $y=-x$ . Alltså uppfyller alla punkter på linje B  $x+y=0$ . Eftersom  $x+y$  för vara mindre än 0 räknas även allt under B som  $x+y \leq 0$

## Bedömda elevarbeten Del C

### Bedömda elevarbeten till uppgift 13

#### Elevarbete 1

$$1. \quad 12 \cdot 3,14 = 37,68$$

Svar Myran har gått 37,68 cm

$$\overline{U} \quad \frac{16 \cdot 3,14}{2} = 25,12 \quad \frac{8 \cdot 3,14}{2} = 12,56$$


$$25,12 + 12,56 = 37,68$$

Svar: Den har gått 37,68 cm

#### Bedömning


Förmågor	E	C	A	Poäng	Motivering
Begrepp					
Procedur	X			1/0/0	
Problemlösning	X			2/0/0	
	X				
Modeller					
Resonemang					
Kommunikation	☒				
Summa				3/0/0	

## Elevarbete 2



$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

Svar: 37,68 cm har myran gått.



En sådan här "bit" av kvadraten är lika stor som en fjärdedel av en cirkel.  
Så det enda jag behöver göra är att räkna ut alla "bitar" tillsammans och sedan dividera det med fyra.




6 är radien och 12 är diametern.

$$\text{Omkrets: } 2\pi r = \pi \cdot d = 2 \cdot 3,14 \cdot 6 = 3,14 \cdot 12 = 37,68$$

Omkretsen är 37,68 cm, den sträckan som myran går, myrans promenad med andra ord.

Myrans promenad blir alltid lika lång  $\pi \cdot 12 = 3,14 \cdot 12 = 37,68$ . Om inte kvadraten har andra mätt, annars är det ganska självklart att den blir kortare eller längre.



Det är ganska enkelt att se hur figur 1 och figur 2 hänger ihop. Båda är kvadrater med 12 cm på varje sida.

Det enda som skiljer dem åt är att cirkelbögarna är dika länga, men ger samma svar.

Promenaden blir alltid  $\pi \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$

## Bedömning

Förmågor	E	C	A	Poäng	Motivering
Begrepp					
Procedur	X			1/0/0	
Problemlösning	X			1/0/0	Eleven påstår att promenaden är lika lång men visar det inte.
Modeller					
Resonemang		X		0/1/0	Eleven kommenterar att promenaden är lika lång eftersom sidan är 12 cm.
Kommunikation					
Summa				2/1/0	

### Elevarbete 3

a)  $12 \cdot \pi \approx 37,68$  Myran går  $37,68\text{ cm}$

b) Lilla cirkeln:  $4+4=8$   $4\pi \approx 12,56$

Stora cirkeln  $8+8=16$   $8\pi \approx 25,12$

Myran går:  $12,56 + 25,12 = 37,68\text{ cm}$

c) Här testar jag radierna 2 och 10 cm.

$2\pi \approx 6,28$

$10\pi \approx 31,40$

Myran går  $6,28 + 31,40 = 37,68\text{ cm}$

Här testar jag radierna 5 och 7 cm

$5\pi \approx 15,70$

$7\pi \approx 21,98$

Myran går  $15,70 + 21,98 = 37,68\text{ cm}$


Efter 4 olika tester och resultatet blir samma så är det ganska bevisat att myrans promenad alltid blir lika lång.

d) Radierna  $9+3$ ,  $8+4$ ,  $7+5$ ,  $6+6$  fungerar.

### Bedömning

Förmågor	E	C	A	Poäng	Motivering
Begrepp					
Procedur	X			1/0/0	
Problemlösning	X X			2/0/0	
Modeller					
Resonemang		X	X	0/1/1	
Kommunikation	X				Elevens redovisning av t.ex. radie och omkrets är knapphändig.
Summa				3/1/1	

Elevarbete 4



Då diametern är 12 cm måste radien vara  $12/2 = 6 \text{ cm}$ .


Omkretsen på cirkeln inom kvadraten blir då  $2\pi \cdot 6 = 37,7 \text{ cm}$

Svar: Myrarn går  $37,7 \text{ cm}$

II

$$\begin{aligned} & \text{Omkrets} = \pi \cdot 16 = 50,26 \text{ cm} \\ & \frac{50,26}{2} = 25,13 \text{ cm} \\ & \text{Omkrets} = \pi \cdot 8 = 25,13 \text{ cm} \\ & 25,13/2 = 12,56 \\ & 25,13 + 12,56 = 37,69 \approx 37,7 \text{ cm} \end{aligned}$$

III Eftersom sidan på kvadraten alltid är 12 cm  
förblir omkretsen på cirkeln eller cirklarna inom kvadraten alltid densamma.



$$5+5=10$$

$$\text{Omkrets} = \pi \cdot 10 = 31,41$$


$$\frac{31,41}{2} = 15,7 \text{ cm}$$

$$7+7=14 \quad \text{Omkrets: } \pi \cdot 14 \approx 44$$


$$44/2 \approx 22$$

$$\text{Total omkrets} = 15,7 + 22 = 37,7 \text{ cm}$$

Omkretsen, det vill säga, myrarnas väg, blir densamma vilken radie du än väljer.



8 cm går att ha som radie då de inte korsar varandra.



9 cm går dock inte att ha som radie då vägarna korsar varandra. Därför går 8 cm att ha som längsta radie.

I och med det kan man ha mätten på radierna:


$$8+4 \text{ cm} \quad 7+5 \text{ cm} \quad 6+6 \text{ cm}$$

Kommentar: De två sista figurerna var i elevarbetet ritat i skala 1:1.

### Bedömning

Förmågor	E	C	A	Poäng	Motivering
Begrepp					
Procedur	X			1/0/0	
Problemlösning	X X	X		2/1/0	
Modeller					
Resonemang		X		0/1/0	Elevens resonemang kring radiens begränsning är inte utförligt.
Kommunikation		X		0/1/0	
Summa				3/3/0	

Elevarbete 5



Omkrets för hela cirkeln =

$$2\pi \cdot 6 = 37,68 \text{ cm}$$

$$37,68/4 = 9,42 \text{ cm}$$

Svar:  $9,42 \cdot 4 = 37,68 \text{ cm} \approx 38 \text{ cm}$

2. 2 stora cirkelbågar (cirkelars  $\frac{1}{4}$  omkrets) =  $2 \cdot \left( \frac{2\pi \cdot 8}{4} \right) =$


$$2 \cdot \left( \frac{50,24}{4} \right) = 2 \cdot 12,56 = 25,12 \text{ cm}$$

$$2 \text{ små cirkelbågar} = 2 \cdot \left( \frac{2\pi \cdot 4}{4} \right) = 2 \cdot \left( \frac{25,12}{4} \right) = 2 \cdot 6,2 = 12,56 \text{ cm}$$

$$25,12 \text{ cm} + 12,56 \text{ cm} = 37,68 \text{ cm} \approx 38 \text{ cm}$$

Vilket är lika lång sträcka som den första.

3. Det är fortfarande samma längd på kvadraten (12 cm) även fast cirkelarnas ( $\frac{1}{4}$ ) radie kan variera, men summan av de två cirkelbågarna på varje 12 cm sida ska bli 12 cm. T.ex 6+6 eller 4+8 som i de här uppgifterna.



(test)  $9+3=12$

Cirkelbåge (liten) omkrets:

$$2\pi \cdot 3 = 18,84 \text{ cm} \quad \frac{18,84}{4} = 4,71 \text{ cm}$$

Cirkelbåge (stör) omkrets:

$$2\pi \cdot 9 = 56,52 \text{ cm} \quad \frac{56,52}{4} = 14,13 \text{ cm}$$

$$\underline{\underline{[\text{Hela vägen}]} = (2 \cdot 4,71) + (2 \cdot 14,13) =}$$


$$= 37,68 \approx 38 \text{ cm}$$

Så långe sträckan på 12 sidorna alltid blir 12 så fungerar det eftersom om den ena cirkelbågens radie ökar så minskar den andras.

På första exemplet blir vägen lika lång på varje cirkelbåge (sida) eftersom de hade samma radie.

Men på det andra exemplet blev två sträckor (cirkelbågar) lite längre och två lite kortare.

$x+y=12$  där både  $x$  och  $y$  är cirkelbågens radie.



### Bedömning

Förmågor	E	C	A	Poäng	Motivering
Begrepp					
Procedur	X	X	X	1/1/1	
Problemlösning	X X	X	X	2/1/1	Eleven bestämmer den största möjliga radien.
Modeller					
Resonemang		X		0/1/0	Eleven för ett resonemang kring radierna på cirklarna men tydliggör inte sambandet mellan radie och omkrets.
Kommunikation		X		0/1/0	
Summa				3/4/2	

Elevarbete 6

I. Omkrets :  $2 \cdot \pi \cdot r$  Radien i cirkeln är 6cm (fig 1)

$$2 \cdot \pi \cdot 6 = 37,699 \dots$$

Eftersom myran går från A-B-C-D-A kan man säga att den går runt hela cirkeln  
 $= 37,699 \text{ cm} \approx 38 \text{ cm}$

II Radier för de små cirklarna är 4 ger:

$$2 \cdot \pi \cdot 4 = 25,132741 \quad \text{vi delar detta i två eftersom två delar endast ger en halvcirkel}$$

$$= 12,566 \text{ cm}$$

Radien för de stora cirklarna är 8cm ger

$$2 \cdot \pi \cdot 8 = 50,26548246 \quad \& \text{ delat i två eftersom det är en halvcirkel}$$

$$25,1327 + 12,566 = 37,699 \approx 38 \text{ cm}$$

III Vägen kommer alltid bli lika lång eftersom om man skär sträckan (radien) på den ena kommer nästa kvartcirkel att vara lika mycket mindre. Vilket resulterar i att det alltid blir samma sträcka! (Radierna fästsammans blir alltid 12)

$$x + y = 12$$

Detta kan bevisas genom att vi utgår från att den totala omkretsen är den uppdelade cirkeln

$$\text{Alltså } 37,69911184 = 2\pi r$$

$$\frac{37,69911184}{2\pi} = 6 = \text{radien} \quad \frac{\pi}{2\pi} = 6$$

Vilket stämmer. Halva kvadratens sida är alltid sex & 12 av hela sidan. Alltså utgör det alltid från samma siffror.

IV

Vi kan räkna ut hur lång diagonalen i fyrkanten är :  $12^2 + 12^2 = 288$   $\sqrt{288} = \boxed{16,97}$

Det betyder att  cirkelbågen endast får gå till nästan mitten av diagonalen för att inte krocka ger :  $\frac{16,97}{2} = 8,485281374$

Eftersom det är samma radie överallt i cirkeln är delta längden på hur långt in i kvadraten den kommer att gå. Om båda halvcirklarna går till mitten skulle det ju endå bli en krock. Så radien får endast vara  $8,485281373$  (det går ju så klart att göra den lite större men jag tror inte att det är vad uppgiften handlar om)

Alltså är max radien det och  $12 - 8,4 \dots = 3,514718627$  ger den minsta radien man kan ha.

Där mellan går alla bra! Radierna måste bara bli gemensamt 12.

### Bedömning

Förmågor	E	C	A	Poäng	Motivering
Begrepp					
Procedur	X	X	X	1/1/1	
Problemlösning	X X	X	X	2/1/1	
Modeller					
Resonemang		X	X	0/1/1	Eleven för inget generellt resonemang kring promenadens längd utan resonerar runt radierna.
Kommunikation		X		0/1/0	
Summa				3/4/3	

## Myrans promenad

1. Cirkelns omkrets  $2\pi r$ 

$$\frac{12}{2} = 6$$

$$\begin{aligned} \frac{2\cdot\pi\cdot 6}{4} &\approx 9,42 \quad (\frac{1}{4} \text{ cirkel}) \\ 9,42 \cdot 4 &\approx 37,7 \end{aligned} \quad \left. \right\} \quad 2\cdot\pi\cdot 6 = \pi\cdot 12$$

Svar: Myran har då gått 37,7 cm

2. Stora cirkelbågen

$$\begin{aligned} \frac{2\cdot\pi\cdot 8}{4} &\approx 12,57 \\ 12,57 \cdot 2 &\approx 25,13 \end{aligned} \quad \left. \right\} \quad \frac{2\cdot\pi\cdot 8}{2}$$

Lilla cirkelbågen

$$\begin{aligned} \frac{2\cdot\pi\cdot 4}{4} &\approx 6,28 \\ 6,28 \cdot 2 &\approx 12,57 \end{aligned} \quad \left. \right\} \quad \frac{2\cdot\pi\cdot 4}{2}$$

$$25,13 + 12,57 \approx 37,7$$

$$\text{Svar: } \frac{2\cdot\pi\cdot 8}{2} + \frac{2\cdot\pi\cdot 4}{2} = 2\cdot\pi\cdot 6 = \pi\cdot 12 \approx 37,7 \text{ cm}$$

3. Varje cirkelbåge är  $\frac{1}{4}$  cirkel. Går myran en lång cirkelbåge så måste det komma en kortare cirkelbåge för att den ska få plats i kvadraten.

$$\begin{aligned} \frac{2\pi x}{4} + \frac{2\pi x}{4} + \frac{2\pi(12-x)}{4} + \frac{2\pi(12-x)}{4} = \\ = \frac{2\pi x}{2} + \frac{2\pi(12-x)}{2} = \pi x + \pi(12-x) = \pi \cdot 12 \end{aligned}$$

4. Cirkelbågen får inte gå över halva diagonalen. Därför måste man ta reda på hur lång den är genom att använda Pythagoras sats.  $a^2 + b^2 = c^2$

$$12^2 + 12^2 = c^2$$

$$\sqrt{288} = \sqrt{c^2}$$

$$16,97 \approx c$$

Det ger oss att halva diagonalen är  $\approx 8,49$  cm

För att cirkelbågarnas väg inte ska möta varandra kan inte radien vara mer än 8,49 cm och inte mindre än 3,51 cm

$$\text{Svar: } 3,51 < r < 8,49$$

### Bedömning

Förmågor	E	C	A	Poäng	Motivering
Begrepp					
Procedur	X	X	X	1/1/1	
Problemlösning	X			2/1/1	
	X	X	X		
Modeller					
Resonemang		X	X	0/1/2	
			X		
Kommunikation		X	X	0/1/1	
Summa				3/4/5	

## Bedömda elevarbeten Del D

### Bedömda elevarbeten till uppgift 19

Elevarbete 1

$$X \cdot Y \cdot Z = 210$$

Du måste få fram 21 och 10 med talen.  
 Du kan använda kombinationen att börja  
 med  $21 \cdot 21 \cdot 2$ .  
 Du kan även få fram det genom att  
 använda Fanz tabell  $3 \cdot 7 \cdot 10$  eller  $6 \cdot 7 \cdot 5$

Svar: 3

1/1/0

E	C	A
B	X	X
P		
Pl		
M		
R		
K	XX	

Elevarbete 2

$$\begin{array}{ll} 2 \cdot 3 \cdot 35 & 5 \cdot 7 \cdot 6 \\ 2 \cdot 5 \cdot 21 & 3 \cdot 7 \cdot 10 \\ 2 \cdot 7 \cdot 15 & 3 \cdot 5 \cdot 14 \end{array}$$


Svar: Det finns 6 olika kombinationer.

1/1/0

E	C	A
B	X	X
P		
Pl		
M		
R		
K	XX	

Kommentar: Visar inte att alla möjliga kombinationer är funna.

Elevarbete 3



1/1/1

E	C	A
B	X	XX
P		
Pl		
M		
R		
K	XX	

Kommentar: Visar att alla kombinationer är funna med hjälp av faktoruppdelning.

Bedömda elevarbeten till uppgift 21b

Elevarbete 1

Josefin har plussat ihop priserna på alla 4 burkarna och sedan delat med 4.

Mikael skulle säkert ha gångrat ihop priset på en 100 g burk med 4,5.

1	/	0	/
E	C	A	
B			
P			
PI			
M			
R	X		
K	XX		

Elevarbete 2

Josefin har räknat ut ett medelvärde

Mikael har kollat på grafen. Vilket i detta läget blir 21,1 kr , vilket han gångrar med 4,5.

2	/	0	/
E	C	A	
B			
P			
PI			
M	X		
R	X		
K	XX		

Elevarbete 3

Josefin har räknat ut ett medelvärde för 100g på föregående uppgift. Mikael har omränt diagrammet för rad 100g kostar och multiplicerat upp det till 450 gram.

2	/	0	/
E	C	A	
B			
P			
PI			
M	X		
R	XX		
K	XX		

Elevarbete 4

Josefin räknar ut genomsnittet för hur mycket 100 g kostar i de olika förpackningarna.

Mikael s Lösning går ut på att räkna ut hur mycket billigare kaffet blir per 100g ju större förpackningen är.

2	/	0	/
E	C	A	
B			
P			
PI			
M	XX		
R	XX		
K	XX		

## Elevarbete 5

Josefin har räknat ut medelvärdet på kaffeburkarnas olika priser och fått fram vad 100g kostar (medelvärdet). Sedan har hon multiplicerat svaret med 4,5 för att få fram vad 450 g kaffe kostar.

Mikael har ritat upp ett diagram där han visar att ju större burk man köper desto billigare blir det per gram. Där har han pekat ut punkten för hur mycket 450g kaffe kostar / 100g och sedan multiplicerat med 4,5 för att få fram exakt hur mycket 450g kostar.

2/2/1

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M	X	X	
R	X	X	X
K	X	X	

## Elevarbete 6

Josefin: räknade ut medelvärdet på 100g från alla burkar. Därefter har hon multiplicerat detta med 4,5 ( $100 \cdot 4,5 = 450$ )

Mikael: kurva där man tydligt ser sambandet minskning av pris = ökning av storlek.  
Han har räknat ut den successiva minskningen och visar tydligt mönstret.

Josefin tänkte inte på denna ökning, då medelvärdet inte var den bästa metoden.

2/2/2

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M	X	X	X
R	X	X	X
K	X	X	



## Kravgränser

### *Maxpoäng*

Detta prov kan ge maximalt 91 poäng fördelade på 31 E-poäng, 39 C-poäng och 21 A-poäng.

### *Provbetylet E*

För att få provbetyget E ska eleven ha erhållit minst 20 poäng.

### *Provbetylet D*

För att få provbetyget D ska eleven ha erhållit minst 32 poäng varav minst 10 poäng på lägst nivå C.

### *Provbetylet C*

För att få provbetyget C ska eleven ha erhållit minst 43 poäng varav minst 19 poäng på lägst nivå C.

### *Provbetylet B*

För att få provbetyget B ska eleven ha erhållit minst 57 poäng varav minst 7 poäng på nivå A.

### *Provbetylet A*

För att få provbetyget A ska eleven ha erhållit minst 66 poäng varav minst 12 poäng på nivå A.

	Provbetyg E	Provbetyg D	Provbetyg C	Provbetyg B	Provbetyg A
Totalpoäng	Minst 20 poäng	Minst 32 poäng	Minst 43 poäng	Minst 57 poäng	Minst 66 poäng
Nivåkrav		Minst 10 poäng på lägst nivå C	Minst 19 poäng på lägst nivå C	Minst 7 poäng på nivå A	Minst 12 poäng på nivå A

## **Insamling av provresultat för matematik kurs 1b**

Från och med höstterminen 2011 utför SCB (Statistiska centralbyrån) på uppdrag av Skolverket en totalinsamling av elevresultat. Information om denna totalinsamling utgår från SCB. Sista dag för insamlingen är den **18 januari 2013**.

Förutom denna totalinsamling genomför provinstitutionen en urvalsinsamling. Denna insamling är nödvändig för att kunna utvärdera och utveckla de nationella kursproven. Genom att du och dina kollegor skickar in resultat kommer vi också att kunna publicera en rapport med resultat från hösten prov under våren. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på [www.prim-gruppen.se](http://www.prim-gruppen.se).

### *Urvalsinsamlingen*

1. Gå in på [www.prim-gruppen.se](http://www.prim-gruppen.se) och klicka på länken **Resultatinsamling kurs 1 ht 2012** som du finner under rubriken Resultatinsamlingar.
2. Skapa ett konto. När du skapar ett konto skriver du **ka12rin** i rutan för provkod.
3. Fyll i lärarenkäten.
4. Fyll i några bakgrundsdata samt elevresultat för **elever födda den 2:a, 7:e, 11:e, 13:e och 22:a i varje månad** i den undervisningsgrupp som genomfört provet.
5. Skicka en kopia av bedömda elevarbeten för **elever födda den 7:e i varje månad till:**

**Stockholms universitet  
MND  
PRIM-gruppen (Kurs 1)  
106 91 Stockholm**

Märk kuvertet med kursnamn (Kurs 1b).

När du skapat ett konto i resultatinsamlingen kan du när som helst logga in och återkomma till insamlingen för att registrera fler resultat. För att det ska vara möjligt att publicera en resultatrapport i vår måste vi ha alla resultat **senast den 23 januari 2013**.

## Provsammanställning – Centralt innehåll kurs 1b

		Poäng			Taluppfattning aritmetik o algebra					Geometri				Samband o förändring					Sannolikhet o statistik		Problemlösning			
Del	Uppgift nr	E	C	A	A1	A2	A3	A4	A5	G1	G2	G3	G4	F1	F2	F3	F4	F5	S1	S2	P1	P2	P3	
A		3	4	4			X			X	X					X	X	X				X		
B	1	2	0	0										X	X									
B	2	1	0	0						X														
B	3	2	0	0				X	X															
B	4	1	1	0						X	X													
B	5	1	0	0										X										
B	6	0	1	0		X	X									X	X	X						
B	7a	0	1	0													X	X	X					
B	7b	0	1	0												X	X	X						
B	8a	1	0	0						X	X													
B	8b	0	2	0						X	X						X	X				X		
B	9	0	2	0																	X	X		
B	10	0	2	0	X	X																		
B	11	0	0	2	X	X	X													X				
B	12	0	2	2				X	X								X	X				X		
C	13	3	4	5		X	X	X	X	X	X	X					X					X		
D	14a	2	0	0		X											X	X				X	X	
D	14b	2	0	0		X										X	X				X	X		
D	15	2	1	0		X	X										X					X		
D	16a	2	0	0		X									X		X							
D	16b	1	1	0																	X			
D	16c	1	1	0												X		X				X		
D	17	1	2	0		X									X	X						X		
D	18a	1	2	0		X											X					X		
D	18b	0	2	2			X										X					X		
D	19	1	1	1	X																	X		
D	20a	1	1	0												X	X	X				X	X	
D	20b	0	2	0		X										X	X	X				X	X	
D	20c	0	2	3		X									X	X						X	X	
D	20d	0	2	0											X	X						X	X	
D	21a	1	0	0		X																		
D	21b	2	2	2		X												X		X		X	X	
		31/39/21			11/10/7					3/3/1				7/13/6					3/3/0		7/10/7			

## Provprofil kurs 1b

		E	C	A
<b>Begrepp</b>	Del A, Muntligt			
	Del B	1 1 3 4 5	7a 7b 8b 9 10 12 11	
	Del C		12	
	Del D	17 19	17 19 20a 20d	19 20c
<b>Procedurer</b>	Del A, Muntligt			
	Del B	2 3 8a	4 6 8b 10	11
	Del C	13	13	13
	Del D	14a 15 16a 16a 18a 20a	20c	
		21a		
<b>Problem- lösning</b>	Del A, Muntligt	M	M	M
	Del B		9	12
	Del C	13 13	13	13
	Del D	14b	15	20c
<b>Matematiska modeller</b>	Del A, Muntligt			
	Del B			
	Del C			
	Del D	14a 15 16c 21b	16c 18a 18b 20b 20c 20d 18b 21b	
			21b	
<b>Matematiska resonemang</b>	Del A, Muntligt	M M	M M	M M
	Del B			
	Del C		13	13 13
	Del D	14b 16b 21b	16b 20b 21b	21b
<b>Kommuni- kation*</b>	Del A, Muntligt			M
	Del B			12
	Del C			13
	Del D			18b 20c
		31	39	21

\* Kommunikation på E-nivå antas vara en förutsättning för att erhålla förmågepoäng i övriga förmågor. Således prövas inte denna förmåga på E-nivå i enskilda uppgifter.

