
Bedömningsanvisningar

Inom parentes anges ett exempel på ett godtagbart svar.

Uppgift nr 1 (6058)

Max 1/0

Korrekt svar ($y = Ce^{-5x}$)

+1 g

Uppgift nr 2 (6059)

Max 2/0

a) Korrekt svar (z_1 och z_2)

+1 g

b) Korrekt svar (z_3)

+1 g

Uppgift nr 3 (6060)

Max 2/0

Godtagbar ansats, t ex förlänger med nämnarens konjugat
med korrekt svar ($2 + 5i$)

+1 g

+1 g

Uppgift nr 4 (6061)

Max 2/0

Godtagbar ansats, visar beräkningar t ex med en tabell
med godtagbart svar (5)

+1 g

+1 g

Uppgift nr 5 (6062)

Max 3/0

Godtagbar ansats, t ex en inledande undersökning om för vilka z som någon
av faktorerna blir noll

+1 g

med godtagbar bestämning av minst två rötter

+1 g

med godtagbar bestämning av ekvationens samtliga rötter

($z_1 = 3i$, $z_2 = -3i$, $z_3 = 1 + 2i$, $z_4 = 1 - 2i$)

+1 g

Uppgift nr 6 (6063)

Max 1/1

Godtagbar ansats, t ex bestämmer absolutbelopp *eller* argument
med någon korrekt rot (t ex $4(\cos 10^\circ + i \sin 10^\circ)$)

+1 g

+1 vg

Uppgift nr 7 (6064)

Max 1/1

Godtagbar ansats, t ex bestämmer derivatan av y , $y' = 2x \ln x + x$
med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ($k = -2$)

+1 g

+1 vg

Uppgift nr 8 (6065)

Max 0/2

- a) Godtagbar bestämning av sambandet mellan absolutbeloppen
("Absolutbeloppen är samma")
- b) Godtagbar bestämning av sambandet mellan argumenten
("Argumentet minskar med 90° när z delas med i ")

+1 vg

+1 vg

Uppgift nr 9 (6066)

Max 1/3

- a) Bestämmer den allmänna lösningen till differentialekvationen korrekt
($y = C_1 e^{-6x} + C_2 e^{2x}$)
- b) Godtagbar ansats, t ex ställer upp korrekt ekvationssystem
med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ($y = 3e^{-6x} + 9e^{2x}$)
- c) Visar att den givna punkten är en minimipunkt

+1 g

+1 vg

+1 vg

+1 vg

Uppgift nr 10 (6067)

Max 0/3/□

Visar att $f'(2) = 0$	+1 vg
Visar att f har ett lokalt minimum för $x = 2$	+1 vg
Motiverar att $x = 2$ är det enda nollstället till $f'(x)$	+1 vg

MVG-kvalitet	visar eleven i denna uppgift genom att:
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning	
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet	analysera funktionen och göra tolkningar som är tillräckliga för att visa att f endast har en extrempunkt, t ex genom att visa att f har ett lokalt minimum för $x = 2$ och motivera att $x = 2$ är det enda nollstället till $f'(x)$
Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang	visa att -80 är funktionens minsta värde, t ex genom att godtagbart redogöra för att den lokala minimipunkten är ett globalt minimum samt visa att funktionsvärdet för den globala minimipunkten är -80
Värderar och jämför metoder/modeller	
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk	redovisa välstrukturerat med ett i huvudsak korrekt matematiskt språk

Elevlösningar återfinns i separata filer i provbanken

Uppgiften ska bedömas med s.k. aspektbedömning. Bedömningsanvisningarna innehåller två delar:

- Först beskrivs i en tabell olika kvalitativa nivåer för tre olika aspekter på kunskap som läraren ska ta hänsyn till vid bedömningen av elevens arbete.
- Därefter ges exempel på bedömda elevlösningar med kommentarer och poängsättning.

Bedömningen avser	Kvalitativa nivåer			Total poäng
	Lägre	→ Högre		
<p>Metodval och genomförande <i>I vilken grad eleven kan tolka en problemsituation och lösa olika typer av problem. Hur fullständigt och hur väl eleven använder metoder och tillvägagångssätt som är lämpliga för att lösa problemet.</i></p>	<p>Eleven beräknar V samt a för minst ett värde på p.</p> <p style="text-align: center;">1-2 g</p>	<p>Eleven visar säkerhet i lösning av problemet genom att beräkna a för minst två värden på p</p> <p style="text-align: center;">2 g och 1 vg</p>	<p>Eleven bestämmer a för minst två värden på p och inleder en generell undersökning, t ex tecknar ekvationen</p> $\pi \int_0^a x^{2p} dx = 2 \cdot \pi \int_0^1 x^{2p} dx$ <p style="text-align: center;">2 g och 2 vg</p>	2/2
<p>Matematiska resonemang <i>Förekomst och kvalitet hos värdering, analys, reflektion, bevis och andra former av matematiskt resonemang.</i></p>	<p>Eleven drar någon slutsats om sambandet mellan a och p (t.ex. "a blir mindre då värdet på p blir större") grundat på en undersökning av minst två specialfall.</p> <p style="text-align: center;">1 g</p>	<p>Eleven beskriver godtagbart hur a beror av p med hjälp av en generell beräkning eller grundat på en undersökning av minst tre specialfall,</p> <p>t ex $a = 2^{\frac{1}{2p+1}}$</p> <p style="text-align: center;">1 g och 1 vg</p>	1/1	
<p>Redovisning och matematiskt språk <i>Hur klar, tydlig och fullständig elevens redovisning är och hur väl eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner.</i></p>	<p>Redovisningen är lätt att följa och förstå och omfattar mer än tre av punkterna. Det matematiska språket är acceptabelt.</p> <p style="text-align: center;">1 vg</p>			0/1
Summa				3/4

MVG-kvalitet	visar eleven i denna uppgift genom att:
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning	använda generell metod, t ex teckna ekvationen $\pi \int_0^a x^{2p} dx = 2 \cdot \pi \int_0^1 x^{2p} dx$ och påbörja en lösning av ekvationen.
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet	
Genomför bevis och/eller analyserar matematiska resonemang	visa att slutsatsen gäller, $a = 2^{\frac{1}{2p+1}}$
Värderar och jämför metoder/modeller	
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk	redovisa välstrukturerat och tydligt med ett i huvudsak korrekt matematiskt språk.

Elevlösningar återfinns i separata filer i provbanken

Uppgift nr 12 (6069)

Max 2/0

- a) Korrekt svar med godtagbar motivering (75°) +1 g
- b) Korrekt svar med godtagbar motivering (6) +1 g

Uppgift nr 13 (6070)

Max 3/1

- a) Anger att antalet bakterier från början är 500 +1 g
 Godtagbar beskrivning av differentialekvationen, t ex ”antalet bakterier ökar med en hastighet som är 20 % av mängden” +1 vg
- b) Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer differentialekvationens lösning, $y = 500e^{0,2t}$ +1 g
 med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar ($2 \cdot 10^5$) +1 g

Uppgift nr 14 (6071)

Max 2/1

- Bestämmer folkmängden i region A som funktion av tiden +1 g
 Ställer upp en ekvation för bestämning av den sökta tidpunkten +1 g
 med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (år 2034) +1 g

Uppgift nr 15 (6072)

Max 0/2

- Godtagbar ansats, t ex tecknar $\frac{dA}{dt} = \frac{dA}{dr} \cdot \frac{dr}{dt}$ +1 vg
 med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (4,0 cm²/dygn) +1 vg

Uppgift nr 16 (6073)

Max 0/3/a

- Godtagbar ansats, t ex visar att täljaren är delbar med $(x-1)$ om $a = -1$ +1 vg
 med godtagbar fortsättning, t ex bestämmer ett värde på b för vilket
 nämnaren är delbar med $(x-1)$ +1 vg
 med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar
 ($a = -1$, $b = 0$ eller $b = 3$) +1 vg

MVG-kvalitet	visar eleven i denna uppgift genom att:
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning	använda en generell metod (faktorsatsen) varav det följer att det inte finns andra värden på a och b som uppfyller det givna villkoret än $a = -1$, $b = 0$ eller $b = 3$
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet	
Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang	
Värderar och jämför metoder/modeller	
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk	

Uppgift nr 17 (6074)

Max 0/3/α

- a) Godtagbar ansats, t ex inser att $k = 2$ ska vara rot till den karakteristiska ekvationen till $y'' - ay' + ay = 0$ +1 vg
 med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ($a = 4$) +1 vg
- b) Bestämmer den allmänna lösningen till $y'' - 4y' + 4y = 0$ eller
 visar att det finns någon funktion som är lösning till $y'' - 4y' + 4y = 0$
 men inte till $y' - 2y = 0$ +1 vg

MVG-kvalitet	visar eleven i denna uppgift genom att:
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning	
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet	dra slutsatsen att alla lösningar till $y'' - 4y' + 4y = 0$ inte är lösningar till $y' - 2y = 0$ med korrekt motivering.
Genomför bevis och/eller analyserar matematiska resonemang	
Värderar och jämför metoder/modeller	
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk	redovisa välstrukturerat och tydligt med ett i huvudsak korrekt matematiskt språk.

Elevlösningar återfinns i separata filer i provbanken

Exempel på bedömda elevlösningar till uppgift 10.
Elevlösning 1 (3 vg och två av MVG-kvaliteterna)

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 48x$$

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 48$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 12x^3 - 12x^2 - 48 = 0$$

$$x^3 - x^2 - 4 = 0$$

$$x^3 - x^2 = 4$$

$$x_1 = 2$$

$$\begin{array}{r} x-2 \overline{) x^3 - x^2 - 4} \\ \underline{-(x^3 - 2x^2)} \\ \phantom{x-2 \overline{) }} + x^2 - 4 \\ \underline{-(x^2 - 2x)} \\ \phantom{x-2 \overline{) }} 2x - 4 \\ \underline{-(2x - 4)} \\ \phantom{x-2 \overline{) }} - 4 \\ \phantom{x-2 \overline{) }} 0 \end{array} \Rightarrow x^2 + x + 2 = 0$$

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = -2 + \frac{1}{4}$$

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{7}{4}$$

$$x + \frac{1}{2} = \pm \frac{\sqrt{7}}{2}i$$

$$x_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}i \quad x_3 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2}i$$

$f'(x)$ är endast definierad för alla reella x

$$\Rightarrow f'(2) = 0$$

$$f''(x) = 3x^2 - 2x$$

minimipunkt $\Rightarrow f''(x) > 0$

$$f''(2) = 3 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 = 12 - 4 = 8$$

$$f(2) = 3 \cdot 2^4 - 4 \cdot 2^3 - 48 \cdot 2 = -80$$

Funktionens minimivärde är -80 .

Kommentar: Eleven analyserar derivatan och gör tolkningarna att $f'(x) = 0$ endast för $x = 2$ samt att f har ett lokalt minimum för $x = 2$. Lösningen uppfyller därför MVG-kvaliteten för analys och tolkning av resultat även om eleven inte drar några slutsatser av sina tolkningar. Eleven ställer upp några villkor för att visa att funktionens minsta värde är -80 men redovisar inte fullständiga resonemang. Lösningen uppfyller därför inte MVG-kvalitet för bevis och resonemang. Eleven redovisar välstrukturerat och med ett i huvudsak korrekt matematiskt språk. Lösningen uppfyller därför MVG-kvaliteten för redovisning och matematiskt språk.

Elevlösning 2 (3 vg och tre av MVG-kvaliteterna)

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 48x$$

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 48$$

$f'(x) = 0$ där det finns extrempunkter

$$0 = 12x^3 - 12x^2 - 48 \quad /12$$

$$0 = x^3 - x^2 - 4$$

$x = 2$ verkar vara lösning

$$0 = 2^3 - 2^2 - 4 \quad - \text{Det stämmer}$$

$$x_1 = 2$$

$$\begin{array}{r} x^2 + x + 2 \\ x^2 - x^2 - 4 \quad | \quad x - 2 \\ \hline -(x^2 - 2x^2) \\ \hline x^2 - 4 \\ -(x^2 - 2x) \\ \hline 2x - 4 \\ -(2x - 4) \\ \hline 0 \end{array}$$

$$(x-2)(x^2+x+2) = 0$$

$$x^2 + x + 2 = 0$$

$$x = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - 2} \quad \frac{1}{4} - 2 < 0$$

Bara $x_1 = 2$ är en reell lösning.

$$f''(x) = 36x^2 - 24x \Rightarrow f''(2) = 144 - 48 > 0$$

$\therefore x = 2$ är en minipunkt till f .

Eftersom $x = 2$ är den enda extrempunkten

till f och $x = 2$ är en minipunkt måste

funktionen minsta värde $f_{\min} = f(2)$

$$\begin{aligned} f(2) &= 3 \cdot 2^4 - 4 \cdot 2^3 - 48 \cdot 2 = 3 \cdot 16 - 4 \cdot 8 - 96 \\ &= 48 - 32 - 96 = 16 - 96 = \underline{\underline{-80}} \end{aligned}$$

Kommentar: Eleven analyserar derivatan och gör tolkningarna att $f'(x) = 0$ endast för $x = 2$ samt att f har ett lokalt minimum för $x = 2$. Lösningen uppfyller därför MVG-kvaliteten för analys och tolkning av resultat. Eleven visar att funktionens minsta värde är -80 genom att godtagbart redogöra för att den lokala minimipunkten är ett globalt minimum. Lösningen uppfyller därför MVG-kvalitet för bevis och resonemang. Eleven redovisar välstrukturerat och med ett i huvudsak korrekt matematiskt språk. Lösningen uppfyller därför MVGkvaliteten för redovisning och matematiskt språk.

Exempel på bedömda elevlösningar till uppgift 11.
Elevlösning 1 (3 g och 1 vg)

$$p = 1$$

$$V = \pi \int_0^1 x^2 dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3} \text{ u.e.}$$

$$2V = \frac{2\pi}{3}$$

$$\pi \int_0^a x^2 dx = \frac{\pi a^3}{3}$$

$$\frac{2\pi}{3} = \frac{\pi a^3}{3}$$

$$a = \sqrt[3]{2}$$

• $p = 2$

$$\pi \int_0^a (x^2)^2 dx = \frac{\pi}{5} \text{ u.e.} \Rightarrow 2V = \frac{2\pi}{5}$$

$$\pi \int_0^a x^4 dx = \frac{\pi a^5}{5} \Rightarrow a = \sqrt[5]{2}$$

• $p = 3$

$$\pi \int_0^a (x^3)^2 dx = \frac{\pi}{7} \text{ u.e.} \Rightarrow 2V = \frac{2\pi}{7}$$

$$\pi \int_0^a x^6 dx = \frac{\pi a^7}{7} \Rightarrow a = \sqrt[7]{2}$$

Slutsats: Det verkar som att sambandet

är att a är udda rot ur 2

$a = \sqrt[3]{2}$, $a = \sqrt[5]{2}$, $a = \sqrt[7]{2}$ osv...

	Kvalitativa nivåer	Poäng	Motiveringar
Metodval och Genomförande	x	2/1	
Matematiska resonemang	x	1/0	
Redovisning och matematiskt språk		0/0	
Summa		3/1	

Kommentar: Eleven drar en enkel slutsats om sambandet för a . Däremot görs ingen koppling mellan a och p i slutsatsen. Lösningen erhåller därmed 1 g för matematiska resonemang

Elevlösning 2 (3 g och 4 vg och tre av MVG-kvaliteterna).

$$p = 1 \Rightarrow y = x$$

$$V = \pi \int_0^1 x^2 dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow 2V = \frac{2\pi}{3}$$

$$V_1 = \pi \int_0^a x^2 dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^a = \frac{\pi a^3}{3}$$

$$\frac{\pi a^3}{3} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow a^3 = 2$$

$$\Rightarrow a = \sqrt[3]{2}$$

$$\boxed{a = \sqrt[3]{2}}$$

$$p = 2 \Rightarrow y = x^2$$

$$V = \pi \int_0^1 x^4 dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{\pi}{5} \Rightarrow 2V = \frac{2\pi}{5}$$

$$V_1 = \pi \int_0^a x^4 dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^a = \frac{a^5 \pi}{5}$$

$$\frac{a^5 \pi}{5} = \frac{2\pi}{5} \Rightarrow a^5 = 2$$

$$\Rightarrow a = \sqrt[5]{2}$$

$$\boxed{a = \sqrt[5]{2}}$$

$$p = 3 \Rightarrow y = x^3$$

$$V = \pi \int_0^1 x^6 dx = \pi \left[\frac{x^7}{7} \right]_0^1 = \frac{\pi}{7} \Rightarrow 2V = \frac{2\pi}{7}$$

$$V_1 = \pi \int_0^a x^6 dx = \pi \left[\frac{x^7}{7} \right]_0^a = \frac{a^7 \pi}{7}$$

$$\frac{a^7 \pi}{7} = \frac{2\pi}{7} \Rightarrow a^7 = 2$$

$$\Rightarrow a = \sqrt[7]{2}$$

$$\boxed{a = \sqrt[7]{2}}$$

Slutsats: a minskar med $\sqrt[2p+1]{2}$

för varje grad p då volymen skall dubblas (om volymen ökas




3 ggr blir det $\sqrt[2p+1]{3}$ osv)

$$\bullet V = \pi \int_0^1 x^{2p} dx = \pi \left[\frac{x^{2p+1}}{2p+1} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2p+1} \Rightarrow 2V = \frac{2\pi}{2p+1}$$

$$V_1 = \pi \int_0^a x^{2p} dx = \pi \left[\frac{x^{2p+1}}{2p+1} \right]_0^a = \frac{\pi a^{2p+1}}{2p+1}$$

$$\frac{2\pi}{2p+1} = \frac{\pi a^{2p+1}}{2p+1} \Rightarrow a^{2p+1} = 2$$

$$a = \sqrt[2p+1]{2}$$

	Kvalitativa nivåer	Poäng	Motiveringar
Metodval och Genomförande		2/2	
Matematiska resonemang		1/1	
Redovisning och matematiskt språk		0/1	
Summa		3/4	

Kommentar: Eleven visar MVG-kvaliteter genom att behandla den generella lösningen och visa hur a beror av p . Dessutom visar eleven MVG-kvalitet genom att redovisningen är välstrukturerad och det matematiska språket är i huvudsak korrekt.

Exempel på bedömda elevlösningar till uppgift 17b).

När eleven löser uppgiften finns delar av det som krävs som lösning till 17b) i 17a). Därför innehåller exemplen på elevlösningarna båda deluppgifterna, men det är endast 17b) som bedöms.

Elevlösning 1 (1 vg).

a) $y' - 2y = 0$ $y'' - ay' + ay = 0$
 $y = C \cdot e^{2x}$ $r^2 - ar + a = 0$
 $r = 2$
 $\rightarrow 4 - 2a + a = 0$
 $4 = a$
 $y = e^{2x} (C + Dx)$ $a = 4$

b) $y = Ce^{2x} + Dx \cdot e^{2x}$
 $y = Ce^{2x}$
Alla lösningar till $y' - 2y = 0$ är
lösningar till $y'' - ay' + ay = 0$ för $a = 4$
om konstanten $D = 0$

Kommentar: Eleven bestämmer den allmänna lösningen men drar inte slutsatsen att det finns lösningar till $y'' - 4y' + 4y = 0$ som inte är lösningar till $y' - 2y = 0$. Lösningen erhåller därmed 1 vg-poäng

Elevlösning 2 (1 vg och en av MVG-kvaliteterna).

$$\left. \begin{array}{l} \textcircled{1} \quad y' - 2y = 0 \\ \textcircled{2} \quad y'' - ay' + ay = 0 \end{array} \right\} \text{ alla lösningar lika}$$

$\textcircled{1} \quad y = Ce^{2x}$ ska vara resultat till alla lösningar på $\textcircled{2}$

$$r = 2 \Rightarrow 2^2 - 2a + a = 0 \rightarrow a = 4$$

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

b) $\textcircled{2} \quad y = e^{2x} (Cx + D)$ Om Cx är 0 så blir $C \cdot \text{nr } \textcircled{1} = D \cdot \text{nr } \textcircled{2}$

$$C_1 e^{2x} = e^{2x} (C_2 x + D_2)$$

$$\downarrow$$
$$C_1 = C_2 x + D_2 \quad \text{Alla fungerar som lösningar om } C_2 \text{ är Noll.}$$

Nej för att

$$C_1 e^{2x} = e^{2x} (C_2 x + D_2)$$

för att

$C_2 x + D$ inte är en konstant

om C_2 inte är noll.

da förändras konstanten och lösningen bara gäller i en punkt på kurvan och inte alla.

$$\underline{C_1 e^{2x} = C_2 x e^{2x} + D e^{2x}}$$

är inte samma sak

Kommentar: Eleven ger en korrekt motivering till varför alla lösningar till $y'' - 4y' + 4y = 0$ inte är lösningar till $y' - 2y = 0$, vilket innebär att eleven erhåller MVG-kvaliteten för analys och tolkning. Däremot kan eleven inte uppnå MVG-kvalitet vad gäller matematiskt språk. T.ex. saknas redovisning av den allmänna lösningen till $y'' - 4y' + 4y = 0$ och på några ställen är kommentarerna otydliga och bristfälliga.